

INVASIEF LOBULAIR BORSTKANKER (ILC) UITZAAIINGEN

ILC kan net als andere borstkankers uitzaaien naar de lever, longen en botten. Specifiek voor ILC geldt dat het naar minder vaak voorkomende plekken zoals het maag-darmstelsel en de eierstokken kan uitzaaien, alsook dat het pas na vele jaren (5 tot 15 en zelfs meer dan 20 jaar) na de eerste behandeling kan uitzaaien.

Eigenschappen van invasief lobulair borstkanker (ILC)*



Alle borstkankers inclusief ILC



Vooral bij ILC




Hoofdzakelijk bij ILC

Symptomen, erger dan de gebruikelijke pijntjes en kwalen, die je aan jouw arts moet melden.

- Onverklaarbare botpijn die niet weggaat, vooral in de rug, heupen, ribben of bovenbenen
- Ongewoon vaginaal/anaal bloedverlies
- Buikpijn, moeite met eten en/of een opgeblazen gevoel
- Onverklaarbaar gewichtsverlies
- Onverklaarbare kortademigheid, pijnlijke ademhaling of hoesten
- Frequent hoofdpijn, duizeligheid, verminderd denkvermogen
- Zwelling of knobbels in de borst, oksel, nek of lies
- Verandering in huidskleur, aanhoudende huiduitslag of stevige knobbeltjes
- Problemen met jouw zicht / veranderingen in het gezichtsvermogen

ILC-UITZAAIINGEN



* in zeer zeldzame gevallen kan ILC ook naar andere lichaamsdelen uitzaaien.